

Koetoiminta ja käytäntö

Liite 18.10.2004 61. vuosikerta Numero 3 Sivu 14

Lehtilaikut heikentävät kevätvehnän elinvoimaa

Mervi Lindroos, Auli Kedonperä ja Yrjö Salo, MTT

ehtilaikkutaudeista vehnänlehti- ja tähkäläikku (syn. Septoria- ja ruskolaikku) vähentää merkittävimmän kevätvehnän satoa. Ongelmallisin tauti on hyvin sateisina kasvukausina. Viljellyistä kevätvehnälajikkeista yksikään ei ole kestävä tätä laikkuautia vastaan.

Vehnänlehti- ja tähkäläikku leviää kasvustossa vain lähietäisyydelle tartuntalähteestä. Laikuissa kehittyneet itiöt leviävät terveisiihin kasveihin kasvien hankautuessa toisiinsa tai vesiroiskeiden välityksellä. Koeolosuhteissa torjuntakynnys on ylittynyt kaikilla lajikkeilla, jos sää on suosinut tautia.

Laikkutaudit sukua keskenään

Vehnänlehti- ja tähkäläikun oireet muistuttavat vehnänlehtilaikkutaudin (DTR) oireita. Erityisesti suorakylvetyillä vehnälohkoilla huomattiin tämä kuluneella kasvukaudella. Vehnänlehtilaikku muistuttaa elintavoiltaan ohran verkkolaikkua. Taudinaliheuttajat leviävät sekä siemenen että kasvinjätteen välityksellä. Siten kevennettyt muokkaustekniikat luovat vehnänlehtilaikulle hyvät elinolosuhteet ja taudin esiintymisriski kasvaa. Toistaiseksi ei tiedetä, eroavatko lajikkeet vehnänlehtilaikkutaudin kestävyydetään merkittävästi toisistaan. Vuoden 2004 kasvukaudesta lähtien vehnälajikkeista havainnoidaan sekä vehnänlehti- ja tähkäläikku- että vehnänlehtilaikkutauti.

Kevätvehnälajikkeet kestävät härmää eri tavoin. Selvästi härmänarin viljelyssä olevista lajikkeista on Tjalve. Vähiten härmää on puolestaan esiintynyt Anniina-, Amaretto-, Vinjett- ja Zebra-lajikkeissa. Näiden lisäksi myös vähän viljellyissä lajikkeissa, Nandussa ja Trisossa, härmää on esiintynyt vähän.

Lehtilaikkutaudit viihtyvät kosteassa

Kevätvehnien tautientorjuntakokeet on toteutettu Mietoisissa MTT:n Lounais-Suomen tutkimusasemalla ja Pälkäneellä MTT:n Hämeen tutkimusasemalla. Koepaikkojen kosteusolot ovat erilaiset. Lounais-Suomessa viljakasvustot ovat viime vuosina kärstineet erityisesti alkukesän kuivuudesta, mutta myös myöhemmin kasvukaudella on satanut vähän. Mietosten kokeet ovatkin viime vuosina kuvastaneet eri lajikkeiden viljelyvarmuutta stressiolosuhteessa. Pälkäneen

metsäiset kasvulohkot tarjoavat suotuisan pienilmaston lehtilaikkutaudeille vähäsateisinakin kasvukausina. Hyvin kuivina kasvukausina lehtilaikkutauteja on vähän, joten kemiallinen torjunta ei juuri kannata. Härmäsiesti kuitenkin viihtyy ja tartuttaa vehnäkasvustoja lehtilaikkutaudeista poiketen myös kuivemmissa kasvuolosuhteissa.

Alustavat viljelysuosituukset

Kevätvehnän torjuntakokeiden perusteella voidaan tehdä vain suuntaa-antavia viljelysuosituksia kasvuolosuhteiden ja lajikkeiden taudinkestävyyden suhteen. Tulokset osoittavat, että mitä suurempi lehtilaikkutautipaine, esimerkiksi vehnänlehti- ja tähkäläikun, sekä mitä alttiimpi lajike, sitä suurempi sadonlisä ruiskutuksista on mahdollista saada. Kevätvehnistä suhteellisen myöhäiset lajikkeet hyötyivät tautien torjunnasta enemmän kuin aikaiset lajikkeet. Lisäksi vehnänlehti- ja tähkäläikun torjunnasta saatava satovaste on merkittävämpi kuin härmän torjunnasta saatava satovaste. Tämä johtunee taudinaiheuttajien erilaisista elintavoista. Vehnänlehti- ja tähkäläikku tuhoaa kasvien yhteyttävä ä lehtipinta-alaa. Härmäsiestien sijaan kasvaa vain elävässä kasvissa ja lisää sen energiankulutusta. Yleisesti stressaantuneen kasviston ruiskuttaminen ei kannata, varsinkaan suhteellisen taudinkestäviä ja aikaisia lajikkeita viljeltäessä.

Lisätietoja: mervi.lindroos@mtt.fi
puh. (03) 4188 2555

Satotulokset ja kasvitautien määrät kevätehnillä MTT:n Lounais-Suomen tutkimusasemalla Mietoisissa ja Hämeen tutkimusasemalla Pälkäneellä vuonna 2001.

Lajike	Mietoinen kg/ha	Sato		Sadonlisä kg/ha	Septoria %		% Härmä
		Käsittelemätön	Käsitelty		Käsittelemätön	Käsitelty	
Anniina	2588	2727	139	2,0	0,0	0,6	0,0
Mahti	3162	3609	447	4,0	0,0	3,5	0,1
Tjalve	2601	3006	405	0,6	0,0	11,3	0,0
Vinjett	2874	3139	265	0,5	0,0	0,0	0,0
Pälkäne							
Lajike	kg/ha	Sato		Sadonlisä kg/ha	Septoria %		% Härmä
		Käsittelemätön	Käsitelty		Käsittelemätön	Käsitelty	
Anniina	4688	5253	565	7,8	0,1	0,3	0,0
Kruunu	6053	6437	384	5,0	0,1	20,0	5,0
Mahti	5374	5924	550	5,0	0,1	17,5	5,0
Tjalve	4592	5334	742	5,0	0,0	41,3	5,0