

Koetoiminta ja käytäntö

Liite 24.10.2000 57. vuosikerta Numero 6 Sivu 7

Typen hyväksikäyttöä maidontuotantoon voidaan tehostaa

*KIMMO KYTÖLÄ, HANNELE KHALILI ja PEKKA HUHTANEN,
Maatalouden tutkimuskeskus*

Maidontuotannon aiheuttamaa typpikuormitusta voidaan vähentää tarkentamalla lannan käsittelyä ja levitystä, sillä jopa yli puolet liotelannan liukoisesta typestä saattaa haihtua ammoniakkina ilmaan lannan käsittelyn ja levityksen aikana. Voitaisiinko myös lannan typpipitoisuutta vähentää? Tällöin lehmän pitäisi pystyä käyttämään rehujen typi paremmin hyväkseen.

Lehmän pitoaika vaikuttaa

Typen hyväksikäyttö paranee, kun lehmä pidetään tuotannossa kauemmin. Mitä useamman vuoden lehmä tuottaa maitoa, sitä pidemmälle ajalle ja suuremmalle maitomääärälle sen kasvatuskautenaan kuluttama typi jakautuu. Siten lehmän pitäminen tuotannossa kahden vuoden sijaan neljä vuotta parantaa sen elinkäistä typen hyväksikäyttöä noin yhden prosenttiyksikön.

Typen hyväksikäyttöä parantaa myös rehuannoksen valkuaispitoisuuden pienentäminen. Jos 7000 kiloa vuodessa lypsävän lehmän rehuannoksen valkuaispitoisuutta pienennetään 16:sta 15:een prosenttiin, paranee typen hyväksikäyttö jälleen noin yhden prosenttiyksikön. Samalla laskisi kuitenkin myös maitotuotos. Siksi onkin löydettävä muita ruokinnallisia keinoja, jos typen hyväksikäytön parantuessa halutaan pitää myös tuotostaso korkeana.

Ruokinta näkyy virtsan typen määrässä

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa sontaan erittynä typen määrään vain rajallisesti. Sen sijaan virtsassa erittynä typen määrään ruokinnan muuttaminen tehoa paremmin.

Tehokas typen hyväksikäyttö edellyttää, että lehmän pötsimikrobit saavat rehusta valkuista (= typeä) ja energiaa oikeassa suhteessa. Lisäksi ohutsuolesta imetytyvien aminohappojen koostumuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin maidontuotannon tarpeita.

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa siihen, miten suuri osa rehun valkuaisesta hajoaa pötsissä, sillä eri rehujen valkuaisen pötsihajoavuus vaihtelee paljon (ja on 50-90 prosenttia). Pötsimikrobit rakentavat pötsissä hajonneesta rehuvalkuaisesta lehmälle käytökelpoista mikrobivalkuista - niin paljon kuin rehusta saamansa energian avulla pystyvät.

Lopun pötsissä hajonneesta valkuaisesta maksa muuttaa ureaksi.

Suuri osa ureasta päätyy virtsaan, osa palaa takaisin pötsiin ja hyvin pieni osa päätyy maitoon. Mitä täsmällisempi pötsissä vapautuvan energian ja valkuaisen suhde on, sitä vähemmän typpeä päätyy ureana virtsaan. Pötsissä muodostunut mikrobivalkuainen ja pötsin hajoamatta ohittanut rehuvalkuainen hajoavat lehmän ohutsuolessa ja imeytyvät aminohippoina. Vasta aminohippoja lehmä voi käyttää maitovalkuaisen muodostamiseen.

Jos yhtä tai useampaa aminohippoa ei imeydy riittävästi, maitovalkuaisen muodostuminen vähenee, typen erityminen virtsaan lisääntyy ja typen hyväksikäyttö maidontuotantoon heikkenee. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa imeytyvien aminohippojen määrään ja suhteisiin.

Kiinnittämällä huomiota säilörehunurmen kasvilajeihin ja lannoitukseen sekä rehun korjuuajankohtaan ja säilöntään voidaan valmistaa hyvälaatuista säilörehua, jossa ei ole liikaa valkuista. Lisäksi lehmälle annetaan sopiva määrä väkirehua, jonka valkuaispitoisuus ja valkuaisen laatu ovat kohdallaan. Nämä pötsin mikrobisto saa tasapainoisesti energiaa ja valkuista, maidontuotantoon on riittävästi aminohippoja ja niiden käytö energian tuotantoon vähenee. Lopulta rehutypen hyväksikäyttö maidontuotantoon voidaan maksimoida ja typen erityminen virtsaan minimoida.

Ruokintatutkimuksissa selvitetään typen hyväksikäyttöä

MTT:ssa viime vuosina tehdyt lysylehmien ruokintatutkimukset sekä Helsingin yliopiston tutkimukset tarjoavat monipuolisen aineiston typen hyväksikäytön selvittämiseen. Tietoja yhdistämällä saadaan tutkittavaksi laaja kirjo tyypillisiä suomalaisia lysylehmien ruokintoja. Kaikkiaan erilaisia koeruokintoja kertyy lähes 300.

Aineiston perusteella on mahdollista verrata esim. säilörehun kasvuasteen, kasvilajikoostumuksen, lannoituksen ja valkuaispitoisuuden vaikutuksia typen hyväksikäytöön maidontuannossa. Myös väkirehun määrän ja valkuaispitoisuuden vaikutusta voidaan arvioida. Tutkimuksen tarkoituksesta on löytää optimaaliset ruokintavaihtoehdot niin, että typen hyväksikäyttö maidontuotantoon voidaan maksimoida ja typen erityminen sontaan ja virtsaan minimoida tinkimättä kuitenkaan maitotuotoksesta. Lisäksi selvitetään mahdollisuksia tehostaa fosforin hyväksikäytöä maidontuannossa.

Lisätietoja: Koetoiminta ja käytäntö 6/2000: 7
sähköposti kimmo.kytola@mtt.fi
puhelin (03) 4188 3691.